

# AestheFill V200

дермальный филлер для инъекционной коррекции морщин и восполнения объема AesteFill V200 (далее по тексту AesteFill V200)

## Информированное согласие

на проведение процедуры по введению медицинского изделия  
AesteFill V200

Я, \_\_\_\_\_ (ФИО  
пациента) \_\_\_\_\_ проживающий(ая) \_\_\_\_\_ по  
адресу: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ контактный  
телефон: \_\_\_\_\_ даю свое  
согласие на проведение процедуры введения медицинского изделия дермальный филлер для инъекционной коррекции  
морщин и восполнения объема AesteFill V200 в косметических целях

врачом \_\_\_\_\_ (ФИО врача)

### Контактный телефон врача: \_\_\_\_\_

Я подробно проинформировал(а) врача об аллергических реакциях и индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, пищевых продуктов и других веществ, о заболеваниях и травмах, которые были у меня в течение жизни, хронической сопутствующей патологии. Я сообщил(а) достоверные сведения о моих вредных привычках и наследственных заболеваниях, а также о перенесенных мною операционных и анестезиологических вмешательствах. Информация о состоянии моего здоровья представлена максимально полно.

Я подтверждаю, что меня проинформировали о ходе процедуры и о применяемом медицинском изделии (МИ): дермальный филлер для инъекционной коррекции морщин и восполнения объема AesteFill V200. Главный материал- смесь: Поли D, L-молочная кислота + натрийкарбоксиметилцеллюлоза (PLA [Poly (D,L-lactide)] + СМС (sodium Carboxymethylcellulose))

Я осознаю, что филлер предназначен для локальных инъекций, используемых в контурной пластике без хирургического вмешательства, для коррекции морщин и восстановления объема тканей, а также создания дополнительного объема. Мне разъяснено, что эстетический эффект от подкожного введения филлера AesteFill V200 в различные слои дермы является длительным, препарат находится в тканях от 4 месяцев до 5 лет в зависимости от индивидуальных особенностей организма, состояния кожи, области введения, количества введенного препарата, его типа, техники инъекции и образа жизни (соблюдения рекомендаций врача, курения, воздействия солнца и проч.), а также, что различные манипуляции, способствующие улучшению кровообращения в зоне инъекций изделия способствуют сокращению его пролонгированного действия.

Мне разъяснено, что анестезия, применяемая при проведении процедуры введения AesteFill V200, может быть местной, аппликационной и инъекционной. Я проинформирован(а) об основных преимуществах и осложнениях различных видов анестезии, которые могут проявляться в виде различных аллергических реакций (анафилактического шока, отека Квинке, обморока, коллапса) и постинъекционных гематом.

### Противопоказания

Я ознакомлен(а) со списком противопоказаний для введения AesteFill V200:

- Острые и хронические заболевания кожи в местах инъекций и окружающих тканях; •повышенная чувствительность к входящим в состав препарата компонентам; •наличие онкологических заболеваний; •беременность; •период грудного вскармливания; •обострение воспалительных заболеваний; •нарушение свертываемости крови и применение антикоагулянтов; • аутоимунные заболевания •почечная недостаточность; •введение препарата в область губ, вокруг рта, вокруг глаз; •возраст до 18 лет у пациентов с врожденной или идиопатической метгемоглобинемией •инфекционные заболевания •наличие других перманентных филлеров (имплантатов) в зоне предполагаемой инъекции •в местах расположения кровеносных сосудов (внутрисосудистое попадание препарата).

### Побочное действие

Врач предупредил меня, и я осознаю, что как во время, так и после проведенной манипуляции в местах инъекций и вокруг них возможно возникновение побочных эффектов: • Реакции в местах инъекций: подкожные кровоизлияния, боль, отек, гематомы. (Реакции немедленного возникновения, т.к. возникает в момент проведения инъекции и обусловлено самой спецификой процедуры. Данные реакции проходят самостоятельно в течение 2-7 дней.) • Реакции со стороны иммунной системы: при наличии повышенной чувствительности к входящим в состав препарата компонентам возможно развитие гиперчувствительности, аллергических реакций (кожный волдырь, аллергическая крапивница, анафилактический шок, ангионевротический отек (отек Квинке). Реакции замедленного типа отсутствуют при применении изделия в соответствии с настоящей инструкцией, однако они могут возникнуть при его использовании в случае наличия патологического агента (заболеваний, являющихся противопоказаниями к применению).

Осложнения: • После использования данного филлера могут возникнуть в виде небольших гематом, отеков, покраснений и эритемы. Возникают они на 3-5 день и самостоятельно исчезают обычно в течение 1-2 недель, не требуют медицинского купирования. Гранулематозная реакция может возникнуть при наличии патологического агента. • Возникновения уплотнений в месте введения филлера. Уплотнения ткани не заметны внешне, но могут прощупываться. Данное проявление может возникнуть через 5- 7 дней и проходит самостоятельно в течение 14-21 дней и не требует медицинского купирования.

Врач предупредил меня, что при возникновении других, не перечисленных выше явлений или при длительности воспалительной реакции свыше 7 дней, мне следует немедленно сообщить об этом своему лечащему врачу.

Я обязуюсь соблюдать и выполнять все рекомендации моего лечащего врача до и после процедуры, такие как:

- Не пользоваться макияжем в течение 12 часов после введения препарата. • Избегать продолжительного пребывания на солнце, воздействия ультрафиолетовых лучей и температур ниже 0°C. • Не посещать сауну или баню в течение 2-х недель после процедуры.

Я понимаю, что некоторые из возможных осложнений потребуют лечения в течение нескольких месяцев до полного их исчезновения. Я подтверждаю, что мой лечащий врач проинформировал меня о ходе процедуры и о применяемом МИ для принятия мною обдуманного решения, а также предоставил достаточно времени для обсуждения протокола процедуры. Мне предоставлена возможность задать врачу все интересующие меня вопросы касательно процедуры, мною получена исчерпывающая информация для принятия решения о получении процедуры.

Таким образом, я осознанно и ответственно даю свое согласие на проведение данной процедуры по введению медицинского изделия дермальный филлер для инъекционной коррекции морщин и восполнения объема AesteFill V200 моим лечащим врачом.

Я согласен(на) на проведение фото- и видеосъемки процедуры и разрешаю врачу использовать мои фото- и видеоматериалы до и после лечения в научных целях.

Номер партии МИ дермальный филлер для инъекционной коррекции морщин и восполнения объема AesteFill V200: \_\_\_\_\_

Адрес места оказания услуги: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. пациента: \_\_\_\_\_

Подпись пациента: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Ф.И.О. врача:

Подпись врача:

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.